

レジメンコード	レジメン名	コメント
05A003	大腸FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速)day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A004	大腸FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速)day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A005	大腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A006	大腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A008	大腸Bmab+FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A009	大腸Bmab+FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A010	大腸Bmab+mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A011	大腸Bmab+mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A020-a	大腸Cmab単剤(初回)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎
05A020-b	大腸Cmab単剤(2回目以降)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎
05A020-c	大腸Cmab単剤(500mg/m ²)(初回)	Cet:500mg/m ² day1 2w毎
05A020-d	大腸Cmab単剤(500mg/m ²)(2回目以降)	Cet:500mg/m ² day1 2w毎
05A024-c	大腸Cmab+CPT-11(500mg/m ²)(初回)	Cet: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎

05A024-d	大腸Cmab+CPT-11(500mg/m ²)(2回目以降)	Cet: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A025	大腸CPT-11単剤(隔週)	CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎 通常のCPT-11を2w毎に2-3回投与し、その後3w休薬
05A026	大腸CapeOX(APR)	L-OHP:130mg/m ² day1 カベシタピン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタピン2000mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。
05A027	大腸Bmab+CapeOX(APR)	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 カベシタピン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A027-a	大腸Bmab+カベシタピン	Bev:7.5mg/kg day1 カベシタピン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A028	大腸IRIS	CPT-11:100-125mg/m ² day1,15 S-1:80mg/m ² day1-14 4w毎
05A030-a	大腸Pmab単剤(初回)	Pmab:6mg/kg day1 2w毎
05A030-b	大腸Pmab単剤(2回目以降)	Pmab:6mg/kg day1 2w毎
05A034	大腸Pmab+CPT-11	Pmab:6mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A035	大腸Bmab+CPT-11	Bev:5mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A036-a	大腸Bmab+SOX(APR)	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎
05A036-b	大腸Bmab+SOX(L-OHP不耐)	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHPは不耐のためOff S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎
05A040-c	大腸Cmab+FOLFIRI(フルオロピリダゾール)(初回)	Cet:500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎

05A040-d	大腸Cmab+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(2回目以降)	Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A042	大腸Pmab+FOLFOX(ヘパフラッシュ)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A043	大腸Pmab+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A044-a	大腸Cmab+mFOLFOX6(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(初回)	Cet: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A044-b	大腸Cmab+mFOLFOX6(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(2回目以降)	Cet: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A044-d	大腸Cmab+mFOLFOX6入院用(500mg/㎡)(初回)(未梢投与)	Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A045	大腸Bmab+FOLFOXIRI入院用(FosAPR)(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A046	大腸Bmab+FOLFOXIRI外来用(APR)(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: day1 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A048	大腸RAM+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(APR)	Ram:8mg/kg day1 1日 初ナト:200mg/㎡ day1 1日/1カ:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
05A049	大腸RAM+FOLFIRI(RAM単独)	Ram:8mg/kg day1 1日 初ナト:200mg/㎡ day1 1日/1カ:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
05A051	大腸Bmab+ I R I S	Bev:5mg/kg day1,15 CPT-11:100mg/㎡ day1,15 TS-1:80mg/㎡ day1夕～day15朝 4w毎
05A052	大腸mFOLFOX6入院用(未梢投与)【患者限定】	I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A059	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎

05A060	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A061	大腸CapelRI+Bmab	Bev:7.5mg/kg day1 CPT-11:200mg/m ² day1 カベシタピン:1600mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のCPT-11投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタピン1600mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。 ※UGT1A1の検査を行うこと
05A063	大腸Bmab+FTD/TPI	Bev:5mg/kg day1,15 TAS-102:70mg/m ² /day (35mg/m ² /回 分2) day1-5、day8-12 4w毎
05A064	大腸Bmab+mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A065-a	大腸エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab(初回)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 Encorafenib 300mg 1日1回 day1-7 Binimetinib 45mg/回 1日2回 day1-7 1w毎
05A065-b	大腸エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab(2回目～)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 Encorafenib 300mg 1日1回 day1-7 Binimetinib 45mg/回 1日2回 day1-7
05A066	大腸Bmab+5-FU/I-LV外来用(ヘパフラッシュ)(維持療法)	Bmab:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A067	大腸Pmab+5-FU/I-LV 外来用(ヘパフラッシュ)(維持療法)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A068	大腸Cmab+5-FU/I-LV (ヘパフラッシュ)(500mg/m ²)(2回目以降)(維持療法)	Cmab: 500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A069-a	大腸Per+Tra(初回)(先発品使用)	Per:初回840mg/body day1 Tra:初回8mg/kg day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回量 前回治療から6週未満: 2回目以降量
05A069-b	大腸Per+Tra(2回目以降)(先発品使用)	Per:420mg/body day1 Tra:6mg/kg day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回量 前回治療から6週未満: 2回目以降量
05A069-c	大腸Per+Tra(前回投与から6週間以上)(先発)	Per:初回840mg/body day1 Tra:初回8mg/kg day1 3w毎 注) Per+Traは前回治療から6週以上: 初回量 前回治療から6週未満: 2回目以降量
05A070	大腸ニボルマブ(240mg/body)+イピリムマブ(1mg/kg)(MSI-High)	ニボルマブ:240mg/body day1 イピリムマブ:1mg/kg day1 3w毎 ※併用4コース終了3週後から、ニボルマブ単独投与(240mg 2w毎or480mg 4w毎)を繰り返す

05A071	大腸ニボルマブ(240mg/body)(MSI-High)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
05A072	大腸ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)(MSI-High)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
05A073	大腸FOLFOXIRI入院用(APR)(へパフラッシュ)	L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:165mg/m ² day1 5-FU: 3200mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A074	大腸FOLFOXIRI外来用(APR)(へパフラッシュ)	L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:165mg/m ² day1 5-FU: 3200mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A075	大腸Per+Tra (皮下注) (初回)	Per+Tra(フェスコIN皮下注) : 15mL day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回レジメン 前回治療から6週未満: 2回目以降レジメン
05A076	大腸Per+Tra(皮下注) (2回目以降)	Per+Tra(フェスコMA皮下注) : 10mL day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回レジメン 前回治療から6週未満: 2回目以降レジメン
05C001	小腸mFOLFOX6外来用(へパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C002	小腸mFOLFOX6入院用(へパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C003	小腸mFOLFOX6入院用(未梢投与)【患者限定】	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C004	【適外】 小腸PTX	PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎
05C005	【適外】 小腸CPT-11単剤	CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
14A002	肛門管5-FU+MMC(CRT)	5-FU:1000mg/m ² day1-4 MMC:10mg/m ² day1 4w毎 4w1コースで、CRT中はday1とday29の計2コース投与する。
14A003	肛門管CDDP+5-FU(80-800)(FosAPR)	CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎

14A004	肛門管CDDP+5-FU(75-1000)(CRT用)(FosAPR)	CDDP:75mg/m ² day1 5-FU:1000mg/m ² day1-4 4w毎 4コースまで実施可能
14A006	【逸外】 肛門管CBDCA+weeklyPTX(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎