

レジメンコード	レジメン名	コメント
09B001	多発性骨髄腫VAD	VCR:0.4mg/body day1-4 ADR:9mg/m ² day1-4 DEX:40mg/body day1-4,9-12,17-20 4w毎
09B003	多発性骨髄腫LPAM200	L-PAM:100mg/m ² day1,2 腫瘍の勢いを抑えるために他の抗癌剤を併用することもある L-PAMは減量することもある
09B004	多発性骨髄腫ボルテゾミブ皮下注射	ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11 3w毎
09B006	多発性骨髄腫CyBorD	ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11 エンドキサン錠:300mg/m ² day1,8,15,22 (500mg/body/dayを上限とする) レナデュクス錠:40mg/body day1-4,9-12,17-20 4w毎
09B008	多発性骨髄腫VLd	ボルテゾミブ:1.3mg/m ² s.c. day1,4,8,11 レナリドミド:25mg/日p.o. day1-14 DEX:40mg/日p.o. day1,8,15 3週毎
09B012-a	多発性骨髄腫KRD(1コース目)	カルフィルゾミブ:27mg/m ² day8,9,15,16 (1コース目day1,2のみ20mg/m ²) 4w毎 レナリドミド:25mg/日p.o. day1-21 DEX:40mg/日p.o. day1,8,15,22・4mg/日p.o. day2,9,16(1コース目)以降必要時継続 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B012-b	多発性骨髄腫KRD(2~12コース目)	カルフィルゾミブ:27mg/m ² day1,2,8,9,15,16 4w毎 レナリドミド:25mg/日p.o. day1-21 デキサメタゾン:40mg/日p.o. day1,8,15,22 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B012-c	多発性骨髄腫KRD(2~12コース目)DEX4mgday2, 9, 16あり	カルフィルゾミブ:27mg/m ² day1,2,8,9,15,16 4w毎 レナリドミド:25mg/日p.o. day1-21 デキサメタゾン:40mg/日p.o. day1,8,15,22・4mg/日p.o. day2,9,16 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B012-d	多発性骨髄腫KRD(13コース目以降)	カルフィルゾミブ:27mg/m ² day1,2,15,16 4w毎 レナリドミド:25mg/日p.o. day1-21 デキサメタゾン:40mg/日p.o. day1,8,15,22 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B012-e	多発性骨髄腫KRD(13コース目以降)DEX4mgday2, 16あり	カルフィルゾミブ:27mg/m ² day1,2,15,16 4w毎 レナリドミド:25mg/日p.o. day1-21 デキサメタゾン:40mg/日p.o. day1,8,15,22・4mg/日p.o. day2,16 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B014-a	多発性骨髄腫Kd(1コース目)	カルフィルゾミブ:56mg/m ² day8,9,15,16 (1コース目day1,2のみ20mg/m ²) 4w毎 DEX:20mg/日p.o. day1,2, 8,9, 15,16, 22,23 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B014-b	多発性骨髄腫Kd(2コース目以降)	カルフィルゾミブ:56mg/m ² day1,2,8,9,15,16 4w毎 DEX:20mg/日p.o. day1,2, 8,9, 15,16, 22,23 * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B018-a	多発性骨髄腫Kd(週1回投与・1コース目)	カルフィルゾミブ:70mg/m ² day8,15 (1コース目day1のみ20mg/m ²) 4w毎 DEX:40mg/日p.o. day1,8,15,22 ※day22は1~9コース目のみ * 生食とは混合不可* * 体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*

09B018-b	多発性骨髄腫Kd(週1回投与・2コース目以降)	カルフィルゾミブ:70mg/m ² day1,8,15 4w毎 DEX:40mg/日p.o. day1,8,15,22 ※day22は1~9コース目のみ *生食とは混合不可* *体表面積2.2m ² 以上の場合2.2m ² として計算*
09B019-a	多発性骨髄腫EPd(1コース目)	エロツズマブ:10mg/kg day1,8,15,22 4w毎 ボマリドミド:4mg/日p.o. day1-21 デキサメタゾン:28mg/日p.o. day1,8,15,22(当日朝7時に内服) *デキサメタゾン28mg(p.o.)はエロツズマブ投与の3~24時間前に投与* 75歳以上ではデキサメタゾン8mg/日p.o.に減量
09B019-b	多発性骨髄腫EPd(2コース目)	エロツズマブ:10mg/kg day1,8,15,22 4w毎 ボマリドミド:4mg/日p.o. day1-21 デキサメタゾン:28mg/日p.o. day1,8,15,22(当日朝7時に内服) *デキサメタゾン28mg(p.o.)はエロツズマブ投与の3~24時間前に投与* ※75歳以上では、デキサメタゾンp.o.は8mgに減量
09B019-c	多発性骨髄腫EPd(3コース目)	エロツズマブ:20mg/kg day1 ボマリドミド:4mg/日p.o. day1-21 4w毎 デキサメタゾン:28mg/日p.o. day1※75歳以上で8mgに減量. デキサメタゾン:40mg/日p.o. day8,15,22 ※75歳以上で20mgに減量 *デキサメタゾン28mg(p.o.)はエロツズマブ投与の3~24時間前に投与* (当日朝7時に内服)
09B019-d	多発性骨髄腫EPd(4コース目以降)	エロツズマブ:20mg/kg day1 ボマリドミド:4mg/日p.o. day1-21 4w毎 デキサメタゾン:28mg/日p.o. day1 ※75歳以上で8mgに減量 デキサメタゾン:40mg/日p.o. day8,15,22 ※75歳以上で20mgに減量 *デキサメタゾン(p.o.)はエロツズマブ投与の3~24時間前に投与* (当日朝7時に内服)
09B021-a	多発性骨髄腫Ispd(1コース目)	イサツキシマブ:10mg/kg day1,8,15,22 4w毎 ボマリドミド:4mg/day p.o. day1-21 デキサメタゾン:33mg/day i.v. day1,8,15,22 75歳以上ではデキサメタゾン:16.5mg/day i.v.に減量
09B021-b	多発性骨髄腫Ispd(2コース目以降)	イサツキシマブ:10mg/kg day1,15 4w毎 ボマリドミド:4mg/day p.o. day1-21 デキサメタゾン:33mg/day i.v. day1,15 デキサメタゾン:40mg/day p.o. day8,22 75歳以上ではデキサメタゾン:16.5mg/day i.v.(20mg/day p.o.)に減量
09B024-a	多発性骨髄腫DLd皮下注(1コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 4w毎 DEX:20mg/日(p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 レナリドミド:25mg/日(p.o.) day1-21 レナリドミドは、CCr>60ml/minの場合25mg、CCr30~60ml/minの場合10mg。適宜増減 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合、DEX20mg/週で投与可 day1ダラキューロ投与1時間前にモンテルカストNa10mg内服(2回目以降は主治医判断)
09B024-c	多発性骨髄腫DLd皮下注(2コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 4w毎 DEX:20mg/日(p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 レナリドミド:25mg/日(p.o.) day1-21 レナリドミドは、CCr>60ml/minの場合25mg、CCr30~60ml/minの場合10mg。適宜増減 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合、DEX20mg/週で投与可
09B024-e	多発性骨髄腫DLd皮下注(3~6コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,15 4w毎 DEX:20mg/日(p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 レナリドミド:25mg/日(p.o.) day1-21 レナリドミドは、CCr>60ml/minの場合25mg、CCr30~60ml/minの場合10mg。適宜増減 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合、DEX20mg/週で投与可
09B024-f	多発性骨髄腫DLd皮下注(7コース目以降)	ダラキューロ:15mL/body day1 4w毎 DEX:20mg/日(p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 レナリドミド:25mg/日(p.o.) day1-21 レナリドミドは、CCr>60ml/minの場合25mg、CCr30~60ml/minの場合10mg。適宜増減 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合、DEX20mg/週で投与可
09B025-b	多発性骨髄腫DBd皮下注(1コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15 3w毎 DEX:20mg/日(p.o.) day1,2,4,5,8,9,11,12,15 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11。毒性に応じて適宜減量 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合、DEX20mg/週で投与可 day1ダラキューロ投与1時間前にモンテルカストNa10mg内服(2回目以降は主治医判断)
09B025-d	多発性骨髄腫DBd皮下注(2~3コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15 3w毎 DEX:20mg/日(p.o.) day1,2,4,5,8,9,11,12,15 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11。毒性に応じて適宜減量 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合、DEX20mg/週で投与可

09B025-f	多発性骨髄腫DBd皮下注(4~8コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1 3w毎 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,4,5,8,9,11,12 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11. 毒性に応じて適宜減量 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満) の場合、DEX20mg/週で投与可
09B025-h	多発性骨髄腫DBd皮下注(9コース目以降)	ダラキューロ:15mL/body day1 4w毎 75歳を超える又は過小(BMI:18.5kg/m ² 未満) の場合、DEX20mg/週で投与可
09B026-b	多発性骨髄腫DMPB皮下注(1コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22,29,36 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11,22,25,29,32※毒性に応じて適宜減量 プレドニゾン:60mg/m ² (p.o.) day2-4 メルファラン(p.o.): 9mg/m ² day1-4 day1ダラツムマ投与1時間前にモンテルカストNa10mg内服(2回目以降は主治医判断)
09B026-d	多発性骨髄腫DMPB皮下注(2-9コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,22 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,8,22,29※毒性に応じて適宜減量 プレドニゾン:60mg/m ² (p.o.) day2-4 メルファラン(p.o.): 9mg/m ² day1-4
09B026-f	多発性骨髄腫DMPB皮下注(10コース目以降)	ダラキューロ:15mL/body day1 4w毎
09B027-a	多発性骨髄腫DKd皮下注(1コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 カルフィルゾミブ:20mg/m ² day1,2 カルフィルゾミブ:56mg/m ² day 8,9,15,16 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16 DEX:40mg/日 (p.o.) day22 75歳超の場合、DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,15,22 DEX:8mg/日 (p.o.) day9,16 モンテルカスト錠10mg day1,8,15,22 メチルプレドニゾン錠20mg day3
09B027-b	多発性骨髄腫DKd皮下注(2コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 カルフィルゾミブ:56mg/m ² day 1,2,8,9,15,16 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16 DEX:40mg/日 (p.o.) day22 75歳を超える場合、DEX:20mg/日 (p.o.) day1,8,15,22 モンテルカスト錠10mg day1,8,15,22
09B027-c	多発性骨髄腫DKd皮下注(3-6コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,15 カルフィルゾミブ:56mg/m ² day 1,2,8,9,15,16 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16 DEX:40mg/日 (p.o.) day22 75歳を超える場合 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,15,22 DEX:12mg/日 (p.o.) day8 DEX:8mg/日 (p.o.) day9 モンテルカスト錠10mg day1,15
09B027-d	多発性骨髄腫DKd皮下注(7コース目以降)	ダラキューロ:15mL/body day1 カルフィルゾミブ:56mg/m ² day 1,2,8,9,15,16 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16 DEX:40mg/日 (p.o.) day22 75歳を超える場合 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,22 DEX:12mg/日 (p.o.) day8,15 DEX:8mg/日 (p.o.) day9,16 モンテルカスト錠10mg day1
09B028-a	アミロイドーシスDCyBorD皮下注(1コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,8,15,22. 毒性に応じて適宜減量 70歳を超える場合、過小体重(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合DEX20mg/週で投与可 CPA:300mg/m ² (p.o.) day1,8,15,22 (500mg/body/dayを上限とする) 4週毎 day1ダラキューロ投与1時間前にモンテルカストNa10mg内服(2回目以降は主治医判断)
09B028-b	アミロイドーシスDCyBorD皮下注(2コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,8,15,22. 毒性に応じて適宜減量 70歳を超える場合、過小体重(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合DEX20mg/週で投与可 CPA:300mg/m ² (p.o.) day1,8,15,22 (500mg/body/dayを上限とする) 4週毎
09B028-c	アミロイドーシスDCyBorD皮下注(3~6コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,15 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,8,15,22. 毒性に応じて適宜減量 70歳を超える場合、過小体重(BMI:18.5kg/m ² 未満)の場合DEX20mg/週で投与可 CPA:300mg/m ² (p.o.) day1,8,15,22 (500mg/body/dayを上限とする) 4週毎

09B028-d	アミロイドーシスDCyBorD皮下注(7コース目以降)	ダラキューロ:15mL/body day1 DEX:20mg/日 (p.o.) day1 4週毎
09B029-a	多発性骨髄腫DPd皮下注(1コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 4w毎 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボマリドミド:4mg/日 (p.o.) day1-21 75歳を超える場合、DEX20mg/週で投与可 day1ダラキューロ投与1時間前にモンテルカストNa10mg内服 (2回目以降は主治医判断)
09B029-b	多発性骨髄腫DPd皮下注(2コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,8,15,22 4w毎 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボマリドミド:4mg/日 (p.o.) day1-21 75歳を超える場合、DEX20mg/週で投与可
09B029-c	多発性骨髄腫DPd皮下注(3~6コース目)	ダラキューロ:15mL/body day1,15 4w毎 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボマリドミド:4mg/日 (p.o.) day1-21 75歳を超える場合、DEX20mg/週で投与可
09B029-d	多発性骨髄腫DPd皮下注(7コース目以降)	ダラキューロ:15mL/body day1 4w毎 DEX:20mg/日 (p.o.) day1,2,8,9,15,16,22,23 ボマリドミド:4mg/日 (p.o.) day1-21 75歳を超える場合、DEX20mg/週で投与可
09B032-a	多発性骨髄腫IsaKd (1コース目)	イサツキシマブ:10mg/kg day1,8,15,22 4w毎 カルフィルゾミブ:20mg/m ² day1,2 カルフィルゾミブ56mg/m ² day 8,9,15,16 デキサメタゾン:16.5mg/day i.v. day1,8,15,22 20mg p.o. day2,9,16,23
09B032-b	多発性骨髄腫IsaKd (2コース目以降)	イサツキシマブ:10mg/kg day1,15, 4w毎 カルフィルゾミブ:56mg/m ² day 1,2,8,9,15,16 デキサメタゾン:16.5mg/day i.v. day1,15, 20mg po day2,8,9,16,22,23
09B033	多発性骨髄腫Isa-d 1200mg/body以下 (1コース目)	イサツキシマブ:20mg/kg day1,8,15,22 デキサメタゾン:33mg/day i.v. day1,8,15,22 4w毎 75歳以上ではデキサメタゾン:16.5mg/day i.v.に減量
09B034	多発性骨髄腫Isa-d 1200mg/body以下 (2コース目以降)	イサツキシマブ:20mg/kg day1,15 デキサメタゾン:33mg/day i.v. day1,15 デキサメタゾン:40mg/day p.o. day8,22 4w毎 75歳以上ではデキサメタゾン:16.5mg/day i.v.(20mg/day p.o.)に減量
09B035	多発性骨髄腫Isa-d 1200mg/body超過 (1コース目)	イサツキシマブ:20mg/kg day1,8,15,22 デキサメタゾン:33mg/day i.v. day1,8,15,22 4w毎 75歳以上ではデキサメタゾン:16.5mg/day i.v.に減量
09B036	多発性骨髄腫Isa-d 1200mg/body超過 (2コース目以降)	イサツキシマブ:20mg/kg day1,15 デキサメタゾン:33mg/day i.v. day1,15 デキサメタゾン:40mg/day p.o. day8,22 4w毎 75歳以上ではデキサメタゾン:16.5mg/day i.v.(20mg/day p.o.)に減量
09B041	多発性骨髄腫エルラナタマブ(1-3回目)	エルラナタマブ:12mg/body day1, 32mg/body day4, 76mg/body day8 投与の60分前に前投薬: デキサメタゾン20mg+ゾフェンヒドラン30mg+アセトアミノフェン700mg 次の場合は、投与量を変更すること: 12mg投与後14日を超える休薬をした場合、12mgを投与する。 32mg投与後15日から28日までの休薬をした場合、32mgを投与する。認容性が認められた場合、1週間後に76mgを投与する。 32mg投与後28日を超える休薬をした場合、12mgを投与する。 76mg投与後43日から84日までの休薬をした場合、32mgを投与する。認容性が認められた場合、1週間後に76mgを投与する。 76mg投与後84日を超える休薬をした場合、12mgを投与する。

09B042	多発性骨髄腫エルラナタマブ(4回目以降)	<p>エルラナタマブ:76mg/body day1 ~24週:週1回 25週以降:2週間に1回(24週間以上投与し奏効が認められている場合) 投与の60分前に前投薬:デキサメタゾン20mg+ジフェンヒドラミン30mg+アセトアミノフェン700mg(4回目以降は医師判断)</p> <p>次の場合は、投与量を変更すること: 76mg投与後43日から84日までの休薬をした場合、32mg(前投薬あり)を投与する。認容性が認められた場合、1週間後に76mg(前投薬あり)を投与する。 76mg投与後84日を超える休薬をした場合、12mg(前投薬あり)を投与する。</p>
--------	----------------------	--