

レジメンコード	レジメン名	コメント
02A007	乳腺VNR	VNR:25mg/m ² day1,8 3w毎
02A013-a	乳腺Tra術後補助(初回)	初回Tra:8mg/kg 2回目以降6mg/kg 3w毎 1年間
02A013-b	乳腺Tra術後補助(2回目以降)	初回Tra:8mg/kg 2回目以降6mg/kg 3w毎 1年間
02A016	乳腺GEM単独療法	GEM:1250mg/m ² day1,8 3w毎
02A016AE	乳腺GEM単独療法(副作用予防)	GEM:1250mg/m ² day1,8 3w毎
02A021	乳腺weekly PTX(12連続)	PTX:80mg/m ² day1 1w毎12週間連続
02A023-a	乳腺VNR+Tra(初回)	VNR:25mg/m ² day1,8 Tra:2mg/kg (初回は4mg/kg) day1,8,15 3w毎
02A023-b	乳腺VNR+Tra(2回目以降)	VNR:25mg/m ² day1,8 Tra:2mg/kg (初回は4mg/kg) day1,8,15 3w毎
02A024	乳腺weekly PTX(3投1休)	PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎
02A030-a	乳腺Tra再発(3週毎)(初回)	初回Tra:8mg/kg 2回目以降6mg/kg 3w毎
02A030-b	乳腺Tra再発(3週毎)(2回目以降)	初回Tra:8mg/kg 2回目以降6mg/kg 3w毎
02A032-b	乳腺GEM+Tra(3週毎)(初回) (副作用予防)	GEM:1200mg/m ² day1,8 HER:8mg/kg (初回) day1 3w毎
02A032-d	乳腺GEM+Tra(3週毎)(2回目以降)(副作用予防)	GEM:1200mg/m ² day1,8 HER:6mg/kg (2回目以降) day1 3w毎

02A035	乳腺エリブリン	エリブリン：1.4mg/m ² day1,8 3w毎
02A036	乳腺weeklyPTX+Bmab	Bev:10mg/kg day1,15 PTX:90mg/m ² day1,8,15 4w毎
02A037-a	乳腺weeklyTra+PTX(12連続)(初回)	PTX:80mg/m ² day1 Tra:初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg day1 1w毎
02A037-b	乳腺weeklyTra+PTX(12連続)(2回目以降)	PTX:80mg/m ² day1 Tra:初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg day1 1w毎
02A037-c	乳腺triweeklyTra+PTX(12連続)(初回)	Tra:6mg/kg (初回8mg/kg) day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎 注) Traは前回治療から6週以上：初回量 前回治療から6週未満：2回目以降量
02A037-d	乳腺triweeklyTra+PTX(12連続)(2回目以降)	Tra:6mg/kg (初回8mg/kg) day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎 注) Traは前回治療から6週以上：初回量 前回治療から6週未満：2回目以降量
02A038	乳腺EC90(APR)	EPI:90mg/m ² day1 CPA:600mg/m ² day1 3w毎
02A040	乳腺FEC(100)(APR)	5-FU:500mg/m ² day1 EPI:100mg/m ² day1 CPA:500mg/m ² day1 3w毎 6サイクル
02A042-a	乳腺エリブリン+Tra(3週毎)(初回)	エリブリン:1.4mg/m ² day1,8 Tra:8mg/kg (初回) day1 3w毎
02A042-b	乳腺エリブリン+Tra(3週毎)(2回目以降)	エリブリン:1.4mg/m ² day1,8 Tra:6mg/kg (2回目以降) day1 3w毎
02A044	乳腺T-DM1	T-DM1:3.6mg/kg day1 3w毎 初回90分で2回目以降忍容性が認めれば30分で投与可
02A053-a	乳腺Per+Tra+PTX(初回)	Per:420mg/body (初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg (初回8mg/kg) day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎 注) PerとTraは前回治療から6週以上：初回量 前回治療から6週未満：2回目以降量
02A053-b	乳腺Per+Tra+PTX(2回目以降)	Per:420mg/body (初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg (初回8mg/kg) day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎 注)PerとTraは前回治療から6週以上：初回量 前回治療から6週未満：2回目以降量

02A054	乳腺TC(DOC+CPA)	DOC:75mg/㎡ day1 CPA:600mg/㎡ day1 3w毎 4コース
02A055	乳腺DOC	DOC:75mg/㎡ day1 3-4w毎
02A057-a	乳腺DOC+Tra(3週毎)(初回)	DOC:75mg/㎡ day1 Tra:8mg/kg (初回) day1 3w毎
02A057-b	乳腺DOC+Tra(3週毎)(2回目以降)	DOC:75mg/㎡ day1 Tra:6mg/kg (2回目以降) day1 3w毎
02A059-a	乳腺Per+Tra+DOC(初回)	Per:420mg/body (初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg (初回8mg/kg) day1 DOC:75mg/㎡ day1 3w毎 注) PerとTraは前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目以降量
02A059-b	乳腺Per+Tra+DOC(2回目以降)	Per:420mg/body (初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg(初回8mg/kg) day1 DOC:75mg/㎡ day1 3w毎 注) PerとTraは前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目以降量
02A059-c	乳腺Per+Tra+DOC(前回投与日から6週間以上)	Per:420mg/body (初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg (初回8mg/kg) day1 DOC:75mg/㎡ day1 3w毎 注) PerとTraは前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目以降量
02A061	乳腺CPT-11	CPT-11:100mg/㎡ day1,8,15,22 6w毎
02A062	乳腺ddAC(APR)	DXR:60mg/㎡ day1 CPA:600mg/㎡ day1 2w毎
02A063	乳腺AC(APR)	DXR:60mg/㎡ day1 CPA:600mg/㎡ day1 3w毎
02A064	乳腺Per+Tra(初回)	Per:初回840mg/body day1, Tra:初回8mg/kg day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目以降量 術前・術後化学療法として使用する場合は合計1年間
02A065	乳腺Per+Tra(2回目以降)	Per:420mg/body day1, Tra:6mg/kg day1, 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目以降量 術前・術後化学療法として使用する場合は合計1年間
02A066	乳腺Per+Tra(前回投与日から6週間以上)	Per:初回840mg/body day1, Tra:初回8mg/kg, day1 3w毎 注) Per+Traは前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目以降量 術前・術後化学療法として使用する場合は合計1年間

02A067	乳腺Tra+S-1(初回)	初回Tra:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg S-1:80-120mg/㎡ 分2 day1-14 3w毎
02A068	乳腺Tra+S-1(2回目以降)	初回Tra:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg day1S-1:80-120mg/㎡ 分2 day1-14 3w毎
02A070	乳腺アテゾリズマブ+nab-PTX	アテゾリズマブ:840mg/body day1,15 Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ※PD-L1陽性、トリプルネガティブ乳癌のみ適応
02A071	乳腺T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン:5.4mg/kg day1 3w毎 初回90分で、2回目以降忍容性が認めれば30分で投与可 HER2陽性・HER2低発現の乳癌に適応
02A072	乳腺T-DM1(術後補助)	T-DM1:3.6mg/kg day1 3w毎 初回90分で忍容性が確認できれば30分で投与可 術後補助化学療法の場合、投与回数は14回まで
02A073	乳腺ベムプロリズマブ+CBDCA+GEM	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 CBDCA:AUC=2 day1,8 GEM:1000mg/㎡ day1,8 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A073AE	乳腺ベムプロリズマブ+CBDCA+GEM(副作用予防)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 CBDCA:AUC=2 day1,8 GEM:1000mg/㎡ day1,8 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A074-a	乳腺ベムプロリズマブ+nab-PTX	NabPTX:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A074-b	乳腺ベムプロリズマブ+nab-PTX(ベムプロリズマブ単剤時)	NabPTX:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A074-c	乳腺ベムプロリズマブ+nab-PTX(nab-PTX単剤時)	NabPTX:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A075-a	乳腺ベムプロリズマブ+PTX	PTX:90mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A075-b	乳腺ベムプロリズマブ+PTX(ベムプロリズマブ単剤時)	PTX:90mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
02A075-c	乳腺ベムプロリズマブ+PTX(PTX単剤時)	PTX:90mg/㎡ day1,8,15 4w毎 ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌

02A076	乳腺ベムプロリズマブ+CBDCA+PTX(術前化学療法)(APR)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC=5 day1 3w毎 ※トリプルネガティブ乳癌 乳腺ベムプロリズマブ+CBDCA+PTX4コース後、乳腺ベムプロリズマブ+AC4コースを術前に実施
02A077	乳腺ベムプロリズマブ+AC(術前化学療法)(APR)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 DXR:60mg/m ² day1 CPA:600mg/m ² day1 3w毎 ※トリプルネガティブ乳癌 乳腺ベムプロリズマブ+CBDCA+PTX4コース後、乳腺ベムプロリズマブ+AC4コースを術前に実施
02A078	乳腺ベムプロリズマブ術後補助(200mg/body)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※トリプルネガティブ乳癌 術後補助療法の場合、200mg/body 3w毎 9回、または400mg/body 6w毎 5回投与
02A079	乳腺ベムプロリズマブ術後補助(6週毎)(400mg/body)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎 ※トリプルネガティブ乳癌 術後補助療法の場合、200mg/body 3w毎 9回、または400mg/body 6w毎 5回投与
02A080	乳腺ddEC(APR)	EPI:90mg/m ² day1 CPA:600mg/m ² day1 2w毎
02A081	乳腺Per+Tra(皮下注)(初回)	Per+Tra(フェスコIN皮下注):15mL/body day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回レジメン 前回治療から6週未満:2回目を降レジメン
02A082	乳腺Per+Tra(皮下注)(2回目を降)	Per+Tra(フェスコMA皮下注):10mL/body day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回レジメン 前回治療から6週未満:2回目を降レジメン
02A083	乳腺Per+Tra(皮下注)+DOC(初回)	Per+Tra(フェスコIN皮下注):15mL/body day1 DOC:75mg/m ² day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回レジメン 前回治療から6週未満:2回目を降レジメン
02A084	乳腺Per+Tra(皮下注)+DOC(2回目を降)	Per+Tra(フェスコMA皮下注):10mL day1 DOC:75mg/m ² day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回レジメン 前回治療から6週未満:2回目を降レジメン
02A085	乳腺Per+Tra(皮下注)+PTX(初回)	Per+Tra(フェスコIN皮下注):15mL day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回レジメン 前回治療から6週未満:2回目を降レジメン
02A086	乳腺Per+Tra(皮下注)+PTX(2回目を降)	Per+Tra(フェスコMA皮下注):10mL/body day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎 注) 前回治療から6週以上:初回レジメン 前回治療から6週未満:2回目を降レジメン
02A089	乳腺Per+Tra+エリブリン(初回 or 前回より6週以上)	Per:420mg/body(初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg(初回8mg/kg) day1 エリブリン:1.4mg/m ² day1,8 3w毎 注) PerとTraは前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目を降量
02A090	乳腺Per+Tra+エリブリン(2回目を降)	Per:420mg/body(初回840mg/body) day1 Tra:6mg/kg(初回8mg/kg) day1 エリブリン:1.4mg/m ² day1,8 3w毎 注) PerとTraは前回治療から6週以上:初回量 前回治療から6週未満:2回目を降量

02A091	乳腺Per+Tra(皮下注)+エリブリン(初回or 前回より6週以上)	Per+Tra(フェスゴIN皮下注)：15mL/body Eribulin：1.4mg/m ² day1,8 3w毎 注)前回治療から6週以上：初回or前回より6週以上レジメン 前回治療から6週未満：2回目以降レジメン
02A092	乳腺Per+Tra(皮下注)+エリブリン(2回目以降)	Per+Tra(フェスゴMA皮下注)：10mL/body Eribulin：1.4mg/m ² day1,8 3w毎 注)前回治療から6週以上：初回or前回より6週以上レジメン 前回治療から6週未満：2回目以降レジメン
02A093	乳腺SG(FosNTP)	SG:10mg/kg day1,8 3w毎 希釈後1.1mg/mL~3.4mg/mLになるように調製すること SGの投与量が750mgを超えた時、Rp5の生食を500mLに変更(275mg未満の時は1.1mg/mLになるように生食抜き取り) ※トリアルチン 乳癌で特効系の治療歴がある患者に使用