

レジメンコード	レジメン名	コメント
11A004	頭頸部CDDP+RT(FosAPR)(8:30～)	CDDP:80mg/m ² day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR≧60ml/min/1.73m ² : 80mg/m ² 60>GFR≧45ml/min/1.73m ² : 60mg/m ² (25%減量) 45ml/min/1.73m ² > GFR : 投与禁忌
11A008-c	頭頸部CDDP+RT(動注、FosAPR)CVポート用	CDDP:100or150mg/m ² day1 動注 1w毎 血管造影施行枠の都合上、 隔週投与となることがある。 根治切除可能な扁平上皮癌には100mg/m ² 、切除不能な扁平上皮癌および 扁平上皮癌以外は150mg/m ² を投与。
11A009	頭頸部PTX	PTX:100mg/m ² day1,8,15,22,29,36 8w毎
11A012a	頭頸部Cmab単剤(初回)	Cet:400mg/m ² day1 1w毎
11A012-b	頭頸部Cmab単剤(2回目以降)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎
11A013a	頭頸部CDDP+5-FU(80-800)+Cmab(初回)(FosAPR)	Cet:400mg/m ² (2回目以降250mg/m ²) 毎週 CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎 ※最高6コースまで実施。
11A013-b	頭頸部CDDP+5-FU(80-800)+Cmab(2回目以降)(FosAPR)	Cet:250mg/m ² 毎週 CDDP:80mg/m ² day1 5FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎 最高6クールまで実施。
11A014a	頭頸部CBDCA+5-FU+Cmab(初回)(FosNTP)	Cet:400mg/m ² (2回目以降250mg/m ²) 毎週 CBDCA:AUC=5 day1 5FU:1000mg/m ² day1-4 3w毎 ※day8、day15はセツキシマブ単剤レジメンを使用する
11A014-b	頭頸部CBDCA+5-FU+Cmab(2回目以降)(FosNTP)	Cet:250mg/m ² 毎週 CBDCA:AUC=5 day1 5FU:1000mg/m ² day1-4 3w毎 ※day8、day15はセツキシマブ単剤レジメンを使用する
11A015a	頭頸部Cmab+RT(初回)	Cet:400mg/m ² day1 1w毎 RT開始日の1週間前に投与
11A015-b	頭頸部Cmab+RT(2回目以降)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎 RT中にCet250mg/m ² を週1回で計7回投与

11A016a	頭頸部PTX+Cmab(初回)	Cet:400mg/㎡(初回),250mg/㎡(2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A016-b	頭頸部PTX+Cmab(2回目以降)	Cet:250mg/㎡(2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A016-c	頭頸部PTX+Cmab(Cmabのみ投与時)	Cet:250mg/㎡(2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A023	頭頸部DOC	DOC:60mg/㎡ day1 3-4w毎
11A024	頭頸部TPF(FosAPR)	DOC:60mg/㎡ day1 CDDP:60mg/㎡ day1 5-FU:700mg/㎡ day1-4 4w毎
11A033	頭頸部ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
11A034	頭頸部ベムプロリズマブ(200mg/body)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎
11A036	頭頸部ベムプロリズマブ+CBDCA+5-FU(FosNTP)	ベムプロリズマブ:200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 5-FU:1000mg/㎡ day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行
11A037	頭頸部ベムプロリズマブ+CDDP+5-FU(100-1000)(FosNTP)	ベムプロリズマブ:200mg/body CDDP:100mg/㎡ day1 5-FU:1000mg/㎡ day1-4 3w ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行
11A038	頭頸部ベムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎
11A039	頭頸部ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
11A040	頭頸部CBDCA+PTX+Cmab(初回)	Cet:400mg/㎡(2回目以降250mg/㎡) day1,8,15 PTX:100mg/㎡ day1,8 CBDCA:AUC=2.5 day1,8 3w毎 ※6コースまで

11A041	頭頸部CBDCA+PTX+Cmab(2回目以降)	Cet:250mg/㎡ day1,8,15 PTX:100mg/㎡ day1,8 CBDCA:AUC=2.5 day1,8 3w毎 ※6コースまで 以後Cet単剤レジメンに移行。
11A042	頭頸部セツキシマブ サロタロカンナトリウム	アキラルックス:640mg/㎡ day1 4w以上あける day2にアキラルックス投与から24時間±4時間後に照射を1回実施。 最大4サイクル。
11A043a	頭頸部Cmab単剤(500mg/㎡)(初回)	Cet:500mg/㎡ day1 2w毎
11A043-b	頭頸部Cmab単剤(500mg/㎡)(2回目以降)	Cet:500mg/㎡ day1 2w毎
11A044	頭頸部CDDP+DOC(75-75)(FosNTP)	CDDP:75mg/㎡ day1 DOC:75mg/㎡ day1 3w毎 ※非扁平上皮癌に限る。
11A045	頭頸部CBDCA+PTX(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/㎡ day1 3w毎 ※非扁平上皮癌に限る。
11A046	頭頸部WeeklyCDDP+RT(術後)(FosAPR)	CDDP:40mg/㎡ day1 ※RTと併用 ※7コース実施 GFR≧50mL/min/1.73㎡ : 40mg/㎡ 50 > GFR ≧ 40mL/min/1.73㎡ : 30mg/㎡(25%減量) 40 > GFR ≧ 30mL/min/1.73㎡ : 20mg/㎡(50%減量) 30mL/min/1.73㎡ > GFR : 投与禁忌
11A047-a	頭頸部PTX+Cmab(500mg/m2)(初回)	Cet:500mg/㎡ day1,15 PTX:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎
11A047-b	頭頸部PTX+Cmab(500mg/m2)(2回目以降)	Cet:500mg/㎡ day1,15 PTX:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎
11C002a	唾液腺DOC+Tra(先発品使用)(初回)	DOC:70mg/㎡ day1 Tra:8mg/kg (初回) day1 3w毎
11C002-b	唾液腺DOC+Tra(先発品使用)(2回目以降)	DOC:70mg/㎡ day1 Tra:6mg/kg (2回目以降) day1 3w毎
11C002-c	唾液腺DOC+Tra(先発品使用)(DOC不耐)(2回目以降)	Tra:6mg/kg (2回目以降) day1 3w毎 ※1週間以上の投与延期の際、8mg/kgへのレジメン変更の疑義照会不要